

# ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

**МЕНОВАЗАН  
ФЛЕКСПРЕЙ  
(MENOVAZAN  
FLEKSPRAY)**

## Склад

*діючі речовини:* бензокаїн (анестезин), прокаїну гідрохлорид (новокаїн), ментол;

100 мл розчину містить анестезину – 1 г, новокаїну – 1 г, ментолу – 2,5 г;

*допоміжна речовина:* етанол 70 %.

## Лікарська форма

Розчин для зовнішнього застосування, спиртовий.

*Основні фізико-хімічні властивості:* прозора безбарвна рідина із запахом ментолу.

## Фармакотерапевтична група

Засоби, що застосовуються місцево при суглобовому та м'язовому болю.

Код АТХ M02A X.

## Фармакологічні властивості

*Фармакодинаміка.*

Препарат має протисвербіжну дію та місцевоанестезуючий ефект. При нанесенні на шкіру та слизові оболонки спричиняє подразнення нервових закінчень, що супроводжується відчуттям холоду, легкого печіння та поколювання.

Чинить легку знеболювальну дію.

*Фармакокінетика.*

При місцевому застосуванні препарат не надходить до кров'яного русла.

## Показання

Препарат призначають при невралгіях, міалгіях, артралгіях.

## **Протипоказання**

Препарат протипоказаний при підвищеній чутливості до новокаїну та інших складових компонентів препарату.

## **Особливі заходи безпеки**

Не наносити на ушкоджену шкіру та шкіру з проявами алергії. Не наносити на шкіру обличчя.

Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу, це може зашкодити здоров'ю.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії**

Компоненти препарату (анестезин, новокаїн) послаблюють антибактеріальну дію сульфаніламідних препаратів. Посилюють ефекти препаратів з місцевоанестезуючою дією.

При одночасному застосуванні будь-яких інших лікарських засобів слід повідомити лікаря.

## **Особливості щодо застосування**

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

У період вагітності і годування груддю застосування препарату можливе лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.*

Не впливає.

## **Спосіб застосування та дози**

Препарат застосовують зовнішньо. ФЛЕКСПРЕЙ рівномірно розпилюють на шкіру ураженої ділянки шкіри та втирають. Препарат використовують 2-3 рази на добу. Тривалість лікування залежить від форми, тяжкості захворювання, ефекту препарату, а також від характеру лікування (монотерапія або в комплексі з іншими лікарськими засобами).

*Діти.*

Не застосовують дітям віком до 12 років.

## **Передозування**

При тривалому застосуванні можливі запаморочення, загальна слабкість, зниження артеріального тиску, алергічні реакції. При появі таких симптомів препарат слід відмінити, залишки змити з поверхні шкіри водою, провести симптоматичну терапію.

## **Побічні ефекти**

Можливі алергічні реакції (гіперемія, подразнення шкіри, відчуття свербіжжю, висипи, набряк, кропив'янка).

У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря.

## **Термін придатності**

3 роки.

Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

## **Умови зберігання**

Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

## **Упаковка**

По 20 мл або по 50 мл у флаконі з механічним розпилювачем, по 1 флакону в пачці.

## **Категорія відпуску**

Без рецепта.