

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ Міністерства охорони**  
**здоров'я України**  
**16.08.2019 № 1820**  
**Реєстраційне посвідчення**  
**№ UA/17592/01/01**

**ЗМІНИ ВНЕСЕНО**  
**Наказ Міністерства охорони**  
**здоров'я України**  
**01.06.2020 № 1285**

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування лікарського засобу**  
**МЕНОВАЗАН**  
**ФЛЕКСПРЕЙ**  
**(MENOVASAN**  
**FLEKSPRAY)**

**Склад:**

*діючі речовини:* бензокаїн (анестезин), прокаїну гідрохлорид (новокаїн), ментол;  
100 мл розчину містить анестезину – 1 г, новокаїну – 1 г, ментолу – 2,5 г;  
*допоміжна речовина:* етанол 70 %.

**Лікарська форма.** Розчин для зовнішнього застосування, спиртовий.

*Основні фізико-хімічні властивості:* прозора безбарвна рідина із запахом ментолу.

**Фармакотерапевтична група.**

Засоби, що застосовуються місцево при суглобовому та м'язовому болю.  
Код АТХ M02A X.

**Фармакологічні властивості.**

*Фармакодинаміка.*

Препарат має протисвербіжну дію та місцевоанестезуючий ефект. При нанесенні на шкіру та слизові оболонки спричиняє подразнення нервових закінчень, що супроводжується відчуттям холоду, легкого печіння та поколювання.

Чинить легку знеболювальну дію.

*Фармакокінетика.*

При місцевому застосуванні препарат не надходить до кров'яного руслу.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.**

Препарат призначають при невралгіях, міалгіях, артралгіях.

**Протипоказання.**

Препарат протипоказаний при підвищеній чутливості до новокаїну та інших складових компонентів препарату.

**Особливі заходи безпеки.**

Не наносити на ушкоджену шкіру та шкіру з проявами алергії. Не наносити на шкіру обличчя. Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу, це може зашкодити здоров'ю.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Компоненти препарату (анестезин, новокаїн) послаблюють антибактеріальну дію сульфаніламідних препаратів. Посилюють ефекти препаратів з місцевоанестезуючою дією. При одночасному застосуванні будь-яких інших лікарських засобів слід повідомити лікаря.

**Особливості застосування.**

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

У період вагітності і годування груддю застосування препарату можливе лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.*

Не впливає.

**Спосіб застосування та дози.**

Препарат застосовують зовнішньо. МЕНОВАЗАН ФЛЕКСПРЕЙ рівномірно розпилюють на шкіру ураженої ділянки шкіри та втирають. Препарат використовують 2-3 рази на добу. Тривалість лікування залежить від форми, тяжкості захворювання, ефекту препарату, а також від характеру лікування (монотерапія або в комплексі з іншими лікарськими засобами).

**Діти.**

Не застосовують дітям віком до 12 років.

**Передозування.**

При тривалому застосуванні можливі запаморочення, загальна слабкість, зниження артеріального тиску, алергічні реакції. При появі таких симптомів препарат слід відмінити, залишки змити з поверхні шкіри водою, провести симптоматичну терапію.

**Побічні реакції.**

Можливі алергічні реакції (гіперемія, подразнення шкіри, відчуття свербіжжю, висипи, набряк, кропив'янка).

У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря.

**Термін придатності.** 3 роки.

Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

**Умови зберігання.**

Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.** По 20 мл або по 50 мл у флаконі з механічним розпилювачем, по 1 флакону в пачці.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Виробник.**

ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика».

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.**

Україна, 12430, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Станишівка, вул. Корольова, б. 4.

Дата останнього перегляду. 01.06.2020 р.